

Tabla de Evidencia Indirecta Potencial por Elementos de Resultados para la CIF de Inseguridad Alimentaria Crónica - IAC

<i>Elemento</i>	<i>Ejemplos de Evidencia Indirecta Potencial para el Análisis CIF Crónica</i>	<i>Ejemplos de la Fuente de Evidencia</i>
Consumo de Alimentos Calidad	<p>Otras medidas de la ingesta infantil de alimentos ricos en micronutrientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - % de niños de 6 a 23 meses que comen carne, pescado, aves queso, yogurt, o cualquier producto lácteo (no-amamantado) - % de niños de 6 a 23 meses que reciben 3 prácticas de Alimentación para Infantes y Niños Pequeños 	DHS Reportes
	<p>Otras medidas de la ingesta dietética infantil</p> <ul style="list-style-type: none"> - % de niños de 6 a 23 meses que reciben una dieta aceptable mínima (MAD) 	Evaluaciones/puntos de referencia de la ONG, incluyendo aquéllos que implementan los programas de desarrollo de USAID/FFP en más de 35 países
	<p>Políticas, producción y disponibilidad de artículos alimentarios básicos fortificados</p> <ul style="list-style-type: none"> - Política gubernamental sobre la fortificación de los artículos alimentarios básicos 	Políticas de los países, conocimiento experto, reportes del Ministerio de Salud
	<p>Otras medidas para la diversidad dietética de las mujeres</p> <ul style="list-style-type: none"> - % de mujeres por la puntuación de la diversidad dietética (WDDS) 	Evaluaciones/puntos de referencia de la ONG, incluyendo aquéllos que implementan los programas de desarrollo de USAID/FFP
	<p>Suplemento de Vitamina A</p> <ul style="list-style-type: none"> - % de niños de 6 a 59 meses que han recibido un suplemento de Vitamina A en los 6 meses previos - % de mujeres que han recibido dosis de Vitamina A después del parto 	DHS, MICS, monitoreo de las instalaciones de salud

Elemento	Ejemplos de Evidencia Indirecta Potencial para el Análisis CIF Crónica	Ejemplos de la Fuente de Evidencia	
Consumo de Alimentos	Cantidad	<p>Respuesta del hogar a la inseguridad alimentaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> -% de hogares que participan en estrategias de afrontamiento -% de hogares por puntajes reducidos del índice de estrategia de afrontamiento (rCSI) -% de hogares según la Escala de Acceso a la Inseguridad Alimentaria del Hogar (HFIAS) -% según la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) 	WFP CFSVA, seleccionado DHS, Proyectos de USAID / FFP, etc.
		% de hogares que son deficientes en energía alimentaria	Encuestas de los Estándares de Vida, WFP/CFSVA
		<p>Otras medidas de consumo alimentario del hogar</p> <ul style="list-style-type: none"> - % de hogares con una diversidad alimentaria baja - % de hogares que comen 1, 2 y más de 3 comidas al día - % de hogares por el número de los grupos de alimentos que consume 	Evaluaciones/puntos de referencia de la ONG, Encuestas de los Estándares de Vida, WFP/CFSVA
		<p>Mujeres que participan en estrategias de afrontamiento relacionadas con cantidad</p> <ul style="list-style-type: none"> - % de mujeres por la frecuencia de: <ul style="list-style-type: none"> Tener tres comidas completas en un día en los últimos 12 meses Saltarse tiempos de comidas Reducir los tamaños de las porciones 	DHS Reportes
		<p>Indicadores compuestos de consumo</p> <ul style="list-style-type: none"> - % de hogares o de mujeres según su clasificación en la Puntuación de Seguridad Alimentaria Compuesta que se basa en los patrones de consumo 	DHS Reportes
		<p>Estacionalidad de la deficiencia de energía</p> <ul style="list-style-type: none"> - % de hogares con deficiencia de energía por mes del año - % de hogares con diversidad dietética pobre por mes del año 	Encuestas de los Estándares de Vida, CFSVA
Estado Nutricional	<p>Prevalencia de Anemia</p> <ul style="list-style-type: none"> - % de Anemia entre los niños por severidad (% de niños con cualquier Anemia (<11.0g/dl), Anemia leve (10.0-10.9 g/dl), Anemia moderada (7.0 to 9.9g/dl), Anemia severa (<7.0g/dl)) 	DHS Reportes, Encuestas de los Indicadores de Malaria	
	<p>Otras evaluaciones nutricionales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bajo peso en niños menores de 5 y mujeres en edad reproductiva - Desnutrición Global y Desnutrición aguda - IMC para las mujeres adultas (% de mujeres levemente delgadas, moderadamente delgadas, severamente delgadas y con sobrepeso u obesas) - Prevalencia de bajo peso al nacer - Prevalencia de ceguera nocturna 	Evaluaciones/puntos de referencia de las ONGs, DHS, MICS, incluyendo aquéllos que están implementando los programas de desarrollo de USAID/FFP, otros estudios y encuestas de nutrición, reportes de monitoreo de las instalaciones de salud	

Fuente: Material de apoyo para Análisis CIF IAC. Octubre 2017. PROGRESAN-SICA.